


Одобрено
Фармакологическим комитетом
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Председатель
Фармакологического центра
д.м.н., проф. Зурдинов А.З. 
от «22» ноября 2014 г.

Утверждаю
Генеральный директор Департамента
лекарственного обеспечения и
медицинской техники при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики
Курманов Р.А. 
от «22» ноября 2014 г.

АНЗИБЕЛ с ароматом меда и лимона
таблетки для рассасывания

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ

АНЗИБЕЛ, таблетки для рассасывания со вкусом меда и лимона

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ

Нет

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки для рассасывания

СОСТАВ

Каждая таблетка для рассасывания Анзибел со вкусом меда и лимона содержит 5 мг хлоргексидина гидрохлорида, 4 мг бензокаина и 3 мг эноксолон в качестве действующих веществ; также ароматизаторы меда и лимона в качестве вкусовых веществ, калия ацесульфам 0.25 мг и сорбитол 1227.00 в качестве подсластителей.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Фармакодинамика:

Таблетки для рассасывания Анзибел со вкусом меда и лимона предупреждают типичное/характерное беспокойство, проявляющееся в виде местного раздражения в ротоглоточной области, за счет антисептического эффекта хлоргексидина, противовоспалительного эффекта эноксолон на буккофарингеальную (щёчно-глоточную) слизистую оболочку и местно анестезирующего эффекта бензокаина.

Фармакокинетика:

Бензокаин, как и большинство местных анестетиков, быстро всасывается через слизистую оболочку и через поврежденную кожу. Бензокаин – местный анестетик, по химической структуре представляющий собой сложный эфир. Анестетики, представляющие собой сложные эфиры, гидролизуются под действием фермента эстеразы в основном в плазме крови и, в меньшей степени, в печени. Небольшое количество большинства анестетиков – сложных эфиров связывается с белками плазмы.

Хлоргексидин, вследствие своей катионоактивной природы, прочно связывается с кожей, слизистой оболочкой и другими тканями и, таким образом, очень плохо всасывается. После приема внутрь концентрация хлоргексидина в плазме крови не обнаруживается.

Эноксолон – ингибитор фермента 11 β -гидроксистероид дегидрогеназы, подавляющего активность кортизола, и при применении с гидрокортизоном в опытах на животных показана повышенная активность гидрокортизона в коже.

ОПИСАНИЕ

Таблетки белого цвета, круглые, со вкусом меда и лимона, с маркировкой «NOBEL» на одной стороне
(Таблетки со вкусом меда и лимона)

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Препараты для лечения заболеваний горла. Антисептики. Прочие препараты
Код АТХ R02AA

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Таблетки для рассасывания **Анзибел со вкусом меда и лимона** оказывают местное и временное симптоматическое облегчение воспалительного состояния ротоглоточной области при умеренной инфекции.

ДОЗИРОВКА и СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Таблетки для рассасывания **Анзибел со вкусом меда и лимона** применимы к ротоглоточной области.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет

Одну таблетку медленно рассасывают. Максимальная суточная доза 8 таблеток с интервалом приема 2-3 ч.

Рекомендуемая доза для детей от 6 до 12 лет

Одну таблетку медленно рассасывают. Максимальная суточная доза 6 таблеток с интервалом приема 4-5 ч.

Таблетки для рассасывания нельзя разжевывать или глотать. Таблетки необходимо медленно рассасывать в ротовой полости. Таблетки для рассасывания нельзя разжевывать или глотать, так как таблетки **Анзибел** оказывают положительный/ благоприятный терапевтический эффект при прямом контакте с воспаленной ротоглоточной областью в течение длительного времени.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Редко были отмечены генерализованные аллергические реакции и нарушения пищеварительной системы. В результате передозировки или длительного применения могут возникнуть отек и гипертензия. Особенно у пациентов, имеющих твердую зубную бляшку (массу из бактерий, остатков эпителиальных клеток и полимеров слюны, прикрепляющихся к эмали зуба), может возникнуть зубная пигментация. Редко может возникнуть дисгеузия (нарушение вкусовой чувствительности), которое постепенно исчезает при продолжении терапии.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Таблетки для рассасывания **Анзибел со вкусом меда и лимона** не должны принимать пациенты, имеющие повышенную чувствительность к компонентам препарата или другим производным сложного эфира, обладающих анестезирующей активностью.

Препарат противопоказан пациентам с фенилкетонурией.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Не рекомендуется принимать препарат одновременно с другими антисептиками.

В исследованиях на животных, в которых одновременно назначали эноксолн и гидрокортизон, последнее мощно действует на кожу.

Из-за наличия бензокаина, препятствует:

- Ингибиторы холинэстеразы: ингибируют метаболизм местной анестезии, с риском большей системной токсичности.
- Сульфонамиды: метаболиты бензокаина могут противодействовать антибактериальную активность сульфонамидов.

Вмешательство диагностическим тестированием

Вмешательство также происходит с помощью диагностического теста, чтобы определить функцию поджелудочной железы с применением бенгитромида. Результаты становятся недействительными потому, что бензокаин метаболизируется ариламины, а также увеличивает количество РАВА. Перед тестированием рекомендуется приостановить лечение менее чем за 3 дня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Применение у спортсменов

Необходимо принять во внимание, что данный препарат содержит бензокаин, который может стать причиной положительного результата при допинг-контроле.

Предостережения в отношении вспомогательных веществ

Каждая таблетка для рассасывания Анзибел со вкусом меда и лимона содержит сорбитол в качестве подсластителя. Сорбитол может вызвать раздражение желудка и диарею.

Таблетки для рассасывания Анзибел не должны принимать пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы.

Препарат также в качестве подсластителя содержит калия ацесульфам, что делает рискованным прием препарата у пациентов, у которых всасывание калия недостаточно.

У таких пациентов после приема препарата внутрь повышается уровень калия в крови, что может стать причиной развития раздражения желудка и диареи.

Перед приемом препарата необходимо ознакомиться с инструкцией. При применении других препаратов, необходимо поставить в известность об этом врача или фармацевта.

Хранить при температуре не выше 25°C, в собственной упаковке. Беречь от детей.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Нет доступных данных относительно применения таблеток для рассасывания Анзибел со вкусом меда и лимона в течение беременности и лактации.

ВЛИЯНИЕ НА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ:

Нет данных

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

Нет данных

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 25°C, в собственной упаковке, в защищенном от света месте. Беречь от детей.

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока хранения.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

УПАКОВКА:

По 30 таблеток для рассасывания **Анзибел со вкусом меда и лимона** в упаковке.

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ :

Таблетки для рассасывания **Анзибел**, по 30 таблеток в упаковке.

Таблетки для рассасывания **Анзибел со вкусом ментола**, по 30 таблеток в упаковке.

Владелец лицензии

: NOBEL İLAÇ SAN.ve TİC. A.Ş.
Стамбул/ТУРЦИЯ

Адрес организации, принимающей на территории Республики Кыргызстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара):

Республика Кыргызстан

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115 а,

Бизнес Центр «Дордой-Плаза»,

4.этаж каб. 4-2

+996 558 555 018

+996 770 977 901